

Morbillo nella Regione Lazio - Aggiornamento del 12 dicembre 2019

Fonte: Sistema di Sorveglianza Integrata Morbillo e Rosolia



I dati riportati possono subire delle variazioni a seguito di nuove segnalazioni e/o validazioni dei casi precedentemente segnalati



Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive



Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
"Lazzaro Spallanzani" - IRCCS
Laboratorio di Virologia



Provincia di domicilio*	N. casi (%)	Incidenza (casi*100.000 abitanti)
LAZIO	510*	8,6
Frosinone	12 (2,4)	2,4
Latina	143 (28,0)	24,8
Rieti	7 (1,4)	4,5
Viterbo	1 (0,2)	0,3
ROMA	347 (68,0)	8,0
Roma 1 [#]	81 (23,3)	7,8
Roma 2 [#]	91 (26,2)	7,0
Roma 3 [#]	35 (10,1)	5,8
Roma 4 [#]	15 (4,3)	4,6
Roma 5 [#]	35 (10,1)	7,0
Roma 6 [#]	90 (26,0)	15,7

*esclusi i 4 casi domiciliati fuori Regione

[#]la percentuale è calcolata su casi della provincia di Roma

514 casi segnalati dall'inizio dell'anno

- ∞ 86% confermati in laboratorio
- ∞ 85% non vaccinati
- ∞ 8% vaccinati con 1 sola dose
- ∞ 44% con almeno una complicanza
- ∞ 55% ricoverati e 28% accessi in pronto soccorso
- ∞ 30 casi in operatori sanitari
- ∞ 12 casi in donne in gravidanza
- ∞ 1 caso di trasmissione dell'infezione al feto
- ∞ 6 casi in bambini di età inferiore ai 6 mesi
- ∞ 64 focolai epidemici:
 - ∞ 48 in ambito familiare
 - ∞ 5 in ambito ospedaliero
 - ∞ 6 in ambito lavorativo
 - ∞ 1 in ambito scolastico
 - ∞ 4 in altri ambiti
- ∞ Età mediana 30 anni



REGIONE LAZIO